

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΥΤΩΝ

### A

Αγλαόνημα 28  
Αδϊαντο 20  
Αζαλέα η ινδική 64  
Αίχμεια η φασιτιάτα 24  
Αλλαμάνδα 152  
Αμαρυλλίς 358  
Ανανάς ο εύκομος 32  
Ανεμώνη 358  
Ανθούριο το σχερζεριανό 36  
Ανυπομονησία 212  
Αράλια η ιαπωνική 44  
Αράχνη 100  
Αρωκάρια η υψικάρηνος 48  
Ασημένια βασίλισσα 28  
Ασπιδίστρα 56  
Ασπένιο 60  
Αφελάνδρα σκουαρόζα 40

### B

Βελοπερόνη *guttata* 76  
Βιγκόνια 68, 72  
Βιολέττα αφρικανική 292  
Βριέσια 344

### Γ

Γάλανθος 358  
Γαρδένια ιασιμοειδής 184  
Γαριδάκι 76  
Γεράνι 256  
Γιασεμί 216  
Γιασεμί της Μαδαγασκάρης 328  
Γιούκα 348  
Γκλοξίνια 312  
Γκουαμάνια 188  
Γυνούρα η πορφυρώδης 192

### Δ

Διεμφεμπάχια η αβρή 148  
Διζυγοθήκη 44  
Δράκαινα 156

### Ε

Ελαφοκέρατο 280  
Ευφορβία η κομψότατη 160

### Z

Ζουμπούλι 357

### I

Ιασιμοειδές το πολυανθές 216  
Ιβίσκος ο σινικός 200  
Ιμπάτιενς η σουλτάνα 212  
Ιππέαστρο 358  
Ίρις 358

### K

Κάκτοι - παχύφυτα 352  
Καλάδιο το δίχρωμο 84  
Καλαθέα 228  
Καλανχόη η μπλοσφεντιάνα 22  
Καληολάρια 362  
Καμπανούλα 88  
Καμικό το ετήσιο 92  
Κέντια Φόρστερ 224  
Κεράκι 204  
Κισσός χεδέρα 196  
Κισσός ανταρκτικής 104  
Κισσόδεντρο 164  
Κιτρέα η μαλακή 108  
Κλίβια 112  
Κόκκος 116  
Κοκκοφοίνικας 116  
Κολομνέα η μικρόφυλλη 124  
Κορδέλα 284  
Κορδουλίνη 128  
Κρίνοι 358  
Κρίνος αφρικανικός 112  
Κρόκος 358  
Κροσσάντρα 132  
Κρότων ο ποικιλόχρωμος 120  
Κρύπτανθος 136  
Κυκλάμινο το περσικό 140  
Κύπερος 144

### M

Μαράντα 228  
Μπανανιά 236  
Μπουκανβίλια η λεία 80  
Μούσα Καβέντις 236  
Νονστέρια η θελκτική 232

### N

Νάρκισσος 358  
Νεορεγέλια καρολίνα 240  
Νεφρολεπίς η έξοχη 244  
Νήριο το ολέανδρο 248

### O

Ορτανσία 208

### P

Πασσιφλόρα η κυανή 252  
Πελαργόνιο 256  
Πεπερόνια η αμβλύφυλη 260  
Πικροδάφνη 248  
Πιλέα η καδιέριος 276  
Πιπεριά 92  
Πλατυσέριο 280  
Ποδόφυλλο 336  
Πόθος 308  
Ποϊνσέττια 160  
Πολυτρίχι 20

Πορτοκαλιά Καλαμοντίν 108  
Πριμούλα 362  
Πτέρις 284

### P

Ροδόδεντρο 64  
Ροϊκισσός ο ρομβοειδής 288  
Ρολδί 252

### Σ

Σαινιτώλια 292  
Σανσεβέρια τριφασσιάτα 296  
Σαξιφράγκα σαρμεντόζα 300  
Σελόζια 362  
Σινεράρια 362  
Σινιγκία η μεγαλόπρηπη 312  
Σκινδαψος ο χρυσός 308  
Σκουλαρίκι 358  
Σολανόν το ψευδοκαπικόν 316  
Σπαθίφυλλο το σουαλιζιανό 324  
Σπαράγγι το φτερωτό 52  
Σπαρμάνια η αφρικανική 320  
Στεφανωτίς η ανθοφόρος 328  
Στρεπτόκαρπος 332  
Συγκνίο το βελλοζιανό 336  
Σχεφφλέρα η ακτινόφυλλη 304  
Σχίζανθος 362

### T

Τηλέγραφος 340  
Τουλίπα 358  
Τραδεσκάντια 340

### Υ

Υάκινθος 357  
Υδράγγειο το μακρόφυλλο 208

### Φ

Φατσεδέρα Λιζέι 164  
Φίκος 168, 172, 176  
Φιλόδεντρο 264, 268  
Φιπτόνια Βερσαφφέλι 180  
Φλαμίνγκο 36  
Φοίνικας 96  
Φοίνικας ο κανάριος 272  
Φτέρη 20  
Φτέρη της Βοστώνης 244

### X

Χαμαιδόρα η κομψή 96  
Χεδέρα 196  
Χλωρόφυτο το εύκομο 100  
Χόγια η σαρκώδης 204  
Χουρμαδιά 272  
Χρυσάνθεμα 363

### Ψ

Ψευτοπιπεριά 316



*Euphorbia pulcherrima*

---

## Ποϊνσέττια (Ευφορβία η κομπότατη)

Η Ποϊνσέττια είναι γνωστή σαν το λουλούδι των Χριστουγέννων από τους φωτεινούς κόκκινους χρωματισμούς που εμφανίζει αυτή την εποχή. Στην πραγματικότητα τ' άνθη μοιάζουν με μικρούς, κίτρινους λοβούς με μαύρους στήμονες στο κέντρο. Η θαυμαστικότητά τους οφείλεται στα κόκκινα βράκτια (παράνθια) φύλλα, που τα περιτριγυρίζουν και δίνουν την εντύπωση άνθους. Η οικογένεια των Ευφορβιδών, στην οποία ανήκει η Ποϊνσέττια, περιλαμβάνει περίπου χίλια είδη φυτών διαφόρων τύπων (μονοετή, πολυετή, θαμνώδη, δενδρώδη ακόμα και παχύφυτα). Οι βλαστοί όλων αυτών των φυτών περιέχουν ένα γαλακτώδη χυμό που λέγεται, ότι είναι δηλητηριώδης.

Κατάγεται από το Μεξικό και στο φυσικό περιβάλλον το φυτό έχει ημιθαμνώδη

μορφή φθάνοντας σε ύψος 5 m.

Μέχρι τα τέλη του 1950 καλλιεργείτο μόνο από ειδικούς, και η διάρκεια ζωής της σ' εσωτερικό χώρο ήταν πολύ περιορισμένη. Τα φύλλα έπεφταν μόλις παρατηρείτο ξηρασία στην ατμόσφαιρα. Σήμερα υπάρχουν ποικιλίες που εγκλιματίζονται σ' εσωτερικούς χώρους. Οι ποικιλίες αυτές έχουν παράνθια φύλλα σε διάφορους χρωματισμούς, που με λίγη φροντίδα, διατηρούνται αρκετό διάστημα. Αγοράζετε φυτά των οποίων τα παράνθια φύλλα έχουν ήδη πάρει τον ανάλογο χρωματισμό, ενώ τα κανονικά φύλλα τους έχουν ζωηρό, πράσινο χρώμα.

### Προβλήματα - Ασθένειες



1. Τα φύλλα κιτρινίζουν, κατσαρώνουν και μετά πέφτουν: Υπερβολική ζέση, ανεπαρκές πότισμα και έλλειψη φωτισμού. Ποτίζετε και ψεκάζετε το φυτό τακτικά. Το μεταφέρετε σε φωτεινή θέση.

2. Τα φύλλα ζαρώνουν και μαραίνονται: Εστίες υγραερίου. Μεταφέρετε το φυτό σε πιο κατάλληλο χώρο.

3. Αδύναμη και ασθενική όψη ολόκληρου του φυτού: Ρεύματα. Το μεταφέρετε σε προφυλαγμένο χώρο.

4. Φύλλα παραμορφωμένα και κολλώδη με πράσινα έντομα: Πράσινη αφίδα. (Μελίγκρα). Ψεκάζετε με παρασκεύασμα Πυρέθρου ή με πυρεθροειδές

(Πάουνς, Desis, Somicidin κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες.

Καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται, επίσης με οργανοφωσφορικά χαμηλής τοξικότητας (Ντιαζινόν ή Μαλάθειο) ή διασυστηματικά. (Ντιμεκρόν, ή Κυλβάλ ή Εκατίν). Οι ψεκασμοί θα γίνονται σε ανοιχτό χώρο μακριά από παιδιά, τρόφιμα, κα-

τοικίδια ζώα και σύμφωνα με τις οδηγίες των συσκευασιών.

5. Φύλλα με ασημένιες ακανόνιστες κηλίδες: Ίωσης. Δεν υπάρχει θεραπεία. Καταστρέψετε το φυτό.






## Μεταφύτευση



1. Μεταφυτεύετε στα μέσα του καλοκαιριού μετά το κλάδεμα, όταν το φυτό φαίνεται «πολύ βαρύ» για τη γλάστρα του και οι ρίζες έχουν μπλεχθεί πάρα πολύ. Ποτίζετε καλά.

2. Τοποθετείτε στον πυθμένα γλάστρας αμέσως επόμενου μεγέθους, στρώμα υλικού αποστράγγισης και στρώμα μειγματος χώματος που δεν περιέχει άργιλλο.



3. Κρατάτε με το ένα χέρι τη βάση της γλάστρας και με το άλλο συγκρατείτε το χώμα, έχοντας τους βλαστούς ανάμεσα στα δάκτυλά σας. Αναποδογυρίζοντας κτυπάτε το χείλος της γλάστρας σε μια σκληρή

ρή κόχη. Το φυτό μαζί με το χώμα θα γλιστρήσει έξω από την γλάστρα.

4. Μην αφαιρείτε το παλιό χώμα από τις ρίζες και, αν το φυτό είναι φυτεμένο σε εσωτερικό γλαστράκι αφήστε το, όπως είναι.



5. Τοποθετείτε το φυτό στο κέντρο της νέας γλάστρας.



6. Γεμίζετε τη γλάστρα με νέο μείγμα χώματος προσέχοντας να καλυφθούν όλες οι ρίζες. Μη συμπιέζετε πολύ το χώμα. Αφήνετε το φυτό στη σκιά για δύο μέρες χωρίς να το ποτίζετε. Αυτό θα παροτρύνει τις ρίζες να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν διακλαδώσεις στο καινούργιο χώμα.

**Μέγεθος:** Ποικίλει. Εξαρτάται από τις ανθισμένες κορυφές των βλαστών. Υπάρχουν φυτά με μία μόνο κορυφή. Επίσης φυτά με 20-30 χρωματιστές κορυφές. Αυτά μπορούν να φθάσουν σε ύψος 50 cm.

**Ανάπτυξη:** Όταν αγοράζετε το φυτό ανθισμένο δεν μεγαλώνει άλλο, εκκείνη την εποχή. Αναπτύσσεται πολύ πριν από την εποχή ανθοφορίας.

**Εποχή ανθοφορίας:** Από τα τέλη του φθινοπώρου μέχρι μερικές φορές και στις αρχές της άνοιξης.

**Οσμή:** Καμιά.

**Φωτισμός:** Το φυτό χρειάζεται καλοφωτισμένη θέση και το χειμώνα έκθεση στον ήλιο. Στην εποχή όμως ανάπτυξης προφυλάξτε το από τον ήλιο.

**Θερμοκρασία:** 12-21° C όσο διατηρούνται τα χρωματιστά βράκτια φύλλα. Τον υπόλοιπο χρόνο το φυτό αντέχει και σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά όχι στην παγωνιά.

**Πότισμα:** Στην εποχή ανάπτυξης και ανθοφορίας διατηρείτε υγρό το χώμα. Ποτίζετε δύο φορές τη βδομάδα. Μετά την ανθοφορία αφήνετε το φυτό να ξεκουραστεί για αρκετές βδομάδες, ποτίζοντας μόνο μία φορά τη βδομάδα. Αυξάνετε το πότισμα μετά το κλάδεμα και τη μεταφύτευση.

**Λίπανση:** Υδροδιαλυτό λίπασμα κάθε 14 μέρες στην εποχή ανάπτυξης και ανθοφορίας.

**Ατμοσφαιρική υγρασία:** Ψεκάζετε το φυτό καθημερινά με νερό, για να διατηρείται η φρεσκάδα των φύλλων.

**Καθάρισμα:** Δεν είναι απαραίτητο. Το ψέκασμα διατηρεί τα φύλλα καθαρά. Μην χρησιμοποιείτε προϊόν γυαλισματος φύλλων.

## Κλάδεμα



1. Κλαδεύετε το φυτό στο τέλος της εποχής ανθοφορίας, για να δυναμώσετε τη νέα βλάστηση. Θυμηθείτε να φορέσετε γάντια.

2. Οι τομές γίνονται ακριβώς πάνω από το μίσχο ενός φύλλου. Αν από την τομή τρέχει χυμός, την πιέζετε ελαφρά με ένα βαμβάκι βουτηγμένο σε βαζελίνη.



**Χώμα:** Μείγματα χώματος χωρίς καθόλου άργιλλο.

**Μεταφύτευση:** Αν διατηρήσετε το φυτό για την επόμενη εποχή, το μεταφυτεύετε μετά το κλάδεμα στα μέσα του καλοκαιριού. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί οι ρίζες και οι βλαστοί είναι πολύ εύθραστοι. Μεταφυτεύετε ξανά μετά από ένα - ενάμισυ μήνα, πριν φθάσει το φυτό σε μέγεθος που αρχίζει ν' ανθίζει. Αν στο φυτό που αγοράσατε ο βλαστός έχει ριζώσει μέσα σ' ένα εσωτερικό γλαστράκι, μην το αφαιρείτε στη μεταφύτευση. Μεταφέρετε αυτό το γλαστράκι, στη νέα γλάστρα.

**Κλάδεμα:** Κορφολογείτε το φυτό την άνοιξη μετά την εποχή ανθοφορίας και πριν τη μεταφύτευση. Αυτό θα βοηθήσει τη νέα βλάστηση.

**Πολλαπλασιασμός:** Με ακραία μοσχεύματα που κόβονται την άνοιξη.

**Διάρκεια ζωής:** Είναι προτιμότερο να θεωρείται φυτό μιας εποχής. Η διατήρηση της Ποϊνσέτίας απαιτεί πεπειραμένους καλλιεργητές και θερμοκήπιο. Η εποχή ανθοφορίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 μήνες.

**Φυτικοί συνδυασμοί:** Είναι προτιμότερο ν' αναπτύσσεται μόνο του. Οι ποϊνσέτιες όμως, που έχουν μόνο μία κορυφή, μπορούν να φυτευτούν μαζί με άλλα πράσινα φυτά και να δημιουργήσουν αντιθετικούς φυτικούς συνδυασμούς.

**Ευκολίες/Δυσκολίες:** Είναι εύκολο, όταν έχει ανθίσει να διατηρηθεί γι' αρκετούς μήνες, αλλά δύσκολο να περάσει από τη μία εποχή στην άλλη. Οι επαγγελματίες καλλιεργητές τις πολλαπλασιάζουν κάθε χρόνο.

### Ατμοσφαιρική υγρασία

Τοποθετείτε τη γλάστρα σε πιάτο με νερό, βότσαλα ή αμμοχάλικο. Το νερό όμως, δεν πρέπει να φθάνει στη βάση της γλάστρας.

Ψεκάζετε καθημερινά το φυτό με ψεκαστήρα χρησιμοποιώντας, αν είναι δυνατό, βροχόνερο. Κρατάτε τον ψεκαστήρα σ' απόσταση 15 cm από τα φύλλα. Μην ψεκάζετε όμως τα βράκτια χρωματιστά φύλλα.


### Ακραία μοσχεύματα



1. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται το καλοκαίρι. Τοποθετείτε σε συρμάτινα γλαστράκια διπλής κατασκευής μείγμα από ίσα μέρη άμμου και χώματος που δεν περιέχει άργιλλο. Φορέστε γάντια, γιατί ο χυμός του φυτού μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.



2. Διαλέγετε μία κορυφή βλασταρίου ή βλαστού που έχει 2 τουλάχιστον ζευγάρια φύλλων και ένα ακραίο σημείο ανάπτυξης. Κόβετε κάτω από το δεύτερο ζευγάρι φύλλων, κοντά στον κύριο βλαστό. Τα μοσχεύματα πρέπει να έχουν μήκος 8-10 cm.




3. Προετοιμάζετε τα μοσχεύματα κόβοντάς τα ακριβώς κάτω από ένα φύλλο.


4. Αφαιρείτε τα δύο κάτω φύλλα.



5. Βυθίζετε την κομμένη επιφάνεια σε σκόνη ορμόνης ριζοβολίας.



6. Οι ποϊνσέτιες έχουν εύθραυστες ρίζες. Τοποθετείτε κάθε μόσχευμα σε δικτυωτό γλαστράκι 5 cm.



7. Ποτίζετε και τοποθετείτε τα γλαστράκια σε θερμαινόμενη συσκευή πολλαπλασιασμού. Θερμοκρασία 21° C. Αφαιρείτε το σκέπασμα για 5 λεπτά κάθε μέρα, για ν' αποφύγετε το σάπισμα και διατηρείτε το χώμα υγρό.



8. Μετά από 21 μέρες αφαιρείτε τελείως το σκέπασμα. Όταν τα μοσχεύματα μεγαλώσουν τα τοποθετείτε μαζί με το γλαστράκι σε κανονική γλάστρα, που τη γεμίζετε με χώμα. Μη συμπιέζετε πολύ το χώμα.



4. Τα μοσχεύματα που κόβονται στα μέσα του καλοκαιριού, θ' ανθίσουν το χειμώνα.